SIFAT-SIFAT MATRIKS YANG TERKAIT DENGAN MATRIKS PARTISI DAN MATRIKS PERMUTASI

AZIZAH AULIA, YANITA, MONIKA RIAN TI HELMI

*Program Studi S1 Matematika,
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas,
Kampus UNAND Limau Manis Padang, Indonesia.
email : eziaulia@gmail.com*

Diterima 9 Maret 2019 Direvisi 7 April 2019 Dipublikasikan 7 Mei 2019

Abstrak. Grup dari representasi grup quaternion dan hasil kali Kronecker memiliki 32 unsur matriks. Tulisan ini akan membahas tentang sifat-sifat yang diperoleh dari pengolahan unsur-unsur matriks suatu grup dari representasi grup quaternion dan hasil kali Kronecker. Sifat-sifat ini terkait dengan matriks partisi dan matriks permutasi, serta dengan memperhatikan sifat matriks simetris dan matriks tidak simetris.

Kata Kunci: Sifat-sifat Matriks, Matriks Partisi, Matriks Permutasi, Matriks Simetris, Matriks Tidak Simetris

1. Pendahuluan

Matriks adalah jajaran empat persegi panjang dari bilangan-bilangan. Bilangan-bilangan dalam jajaran tersebut disebut entri dari matriks [1].

Pada tahun 2018, Yanita, dkk [6] mengkaji suatu grup berdasarkan definisi grup quaternion dan diperoleh suatu grup dari representasi grup quaternion dan hasil kali Kronecker tersebut. Grup tersebut adalah $\mathbb{G} = \{A_k = [a_{ij}] | i, j = 1, 2, 3, 4, k = 1, 2, \dots, 32\}$ yang memiliki 32 unsur matriks yang dicantumkan pada halaman 3. Tulisan ini akan membahas sifat-sifat yang muncul dari pengolahan unsur-unsur matriks dari grup tersebut dengan melibatkan matriks partisi dan matriks permutasi serta dengan memperhatikan sifat matriks simetris dan matriks tidak simetris.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Teori Matriks

Definisi 2.1. [1] *Matriks adalah jajaran empat persegi panjang dari bilangan-bilangan. Bilangan-bilangan dalam jajaran disebut entri dari matriks.*

Definisi 2.2. [2] *Suatu matriks yang memiliki baris dan kolom yang sama dinotasikan dengan $A_{n \times n}$, disebut matriks bujursangkar atau matriks kuadrat.*

Definisi 2.3. [1] Sebuah matriks yang seluruh entrinya adalah bilangan nol disebut matriks nol yang disimbolkan dengan 0 .

Definisi 2.4. [1] Matriks identitas adalah matriks bujursangkar dengan bilangan 1 pada diagonal utamanya dan 0 pada entri-entri lainnya.

Definisi 2.5. [4] Jika A adalah matriks kuadrat atau bujursangkar dan berlaku $A = A^T$ maka A disebut matriks simetris.

Definisi 2.6. [3] Misalkan A adalah matriks berukuran $n \times n$ (bujursangkar atau matriks kuadrat). A dikatakan matriks segitiga atas jika $a_{ij} = 0$ untuk $i > j$. A dikatakan matriks segitiga bawah jika $a_{ij} = 0$ untuk $i < j$. A dikatakan matriks diagonal jika $a_{ij} = 0$ untuk $i \neq j$, sehingga A dikatakan matriks segitiga atas dan segitiga bawah.

Definisi 2.7. [1] Dua matriks adalah setara jika keduanya memiliki ukuran yang sama dan entri-entri yang bersesuaian adalah sama.

Definisi 2.8. [1] Jika A dan B adalah matriks-matriks dengan ukuran yang sama, maka jumlah $A+B$ adalah matriks yang diperoleh dengan menjumlahkan entri-entri pada B dengan entri-entri yang bersesuaian pada A dan selisih $A-B$ adalah matriks yang diperoleh dengan mengurangi entri-entri pada A dengan entri-entri yang bersesuaian pada B . Matriks dengan ukuran yang berbeda tidak dapat dijumlahkan atau dikurangkan.

Definisi 2.9. [1] Jika A adalah matriks $m \times n$ dan B adalah matriks $n \times r$ maka hasil kali AB adalah matriks $m \times r$ yang entri-entrinya ditentukan sebagai berikut. Untuk mencari entri pada baris i dan kolom j dari AB , pisahkan baris i dari matriks A dan kolom j dari matriks B . Kalikan entri-entri yang bersesuaian dari baris dan kolom tersebut, dan kemudian jumlahkan hasil yang diperoleh.

2.2. Matriks Partisi

Definisi 2.10. [4] Matriks blok atau matriks partisi adalah matriks yang dipartisi atau diblok menjadi beberapa matriks yang ukurannya lebih kecil dengan memasukkan garis horizontal dan vertikal antara baris dan kolom matriks. Matriks-matriks yang ukurannya kecil hasil partisi matriks disebut sub matriks.

2.3. Matriks Permutasi

Matriks permutasi terkait dengan matriks identitas yaitu matriks yang diperoleh dengan cara menukarkan baris-baris pada matriks identitas. Hal ini didefinisikan sebagai berikut.

Definisi 2.11. [5] Misalkan σ adalah suatu permutasi. Didefinisikan matriks permutasi $P(\sigma) = [\delta_{i,\sigma(j)}]$, dimana, $\delta_{i,\sigma(j)} = \begin{cases} 1, & \text{jika } i = \sigma(j) \\ 0, & \text{jika } i \neq \sigma(j) \end{cases}$, sedemikian sehingga $ent_{ij}(P(\sigma)) = \delta_{i,\sigma(j)}$.

3. Pembahasan

Unsur dari grup $\mathbb{G} = \{A_k = [a_{ij}] | i, j = 1, 2, 3, 4, k = 1, 2, \dots, 32\}$ dengan matriks A_k adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
A_1 &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, A_2 = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}, A_3 = \begin{bmatrix} i & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -i \end{bmatrix}, A_4 = \begin{bmatrix} -i & 0 & 0 & 0 \\ 0 & i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & i \end{bmatrix}, \\
A_5 &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}, A_6 = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, A_7 = \begin{bmatrix} 0 & i & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & i \\ 0 & 0 & i & 0 \end{bmatrix}, A_8 = \begin{bmatrix} 0 & -i & 0 & 0 \\ -i & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -i \\ 0 & 0 & -i & 0 \end{bmatrix}, \\
A_9 &= \begin{bmatrix} i & 0 & 0 & 0 \\ 0 & i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -i \end{bmatrix}, A_{10} = \begin{bmatrix} -i & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & i \end{bmatrix}, A_{11} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}, A_{12} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \\
A_{13} &= \begin{bmatrix} 0 & i & 0 & 0 \\ -i & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -i \\ 0 & 0 & i & 0 \end{bmatrix}, A_{14} = \begin{bmatrix} 0 & -i & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & i \\ 0 & 0 & -i & 0 \end{bmatrix}, A_{15} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, A_{16} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}, \\
A_{17} &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, A_{18} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, A_{19} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -i \\ -i & 0 & 0 & 0 \\ 0 & i & 0 & 0 \end{bmatrix}, A_{20} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & i \\ i & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -i & 0 & 0 \end{bmatrix}, \\
A_{21} &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, A_{22} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, A_{23} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & i \\ 0 & 0 & i & 0 \\ 0 & -i & 0 & 1 \\ -i & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, A_{24} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -i \\ 0 & 0 & -i & 0 \\ 0 & i & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \\
A_{25} &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & i \\ i & 0 & 0 & 0 \\ 0 & i & 0 & 0 \end{bmatrix}, A_{26} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -i \\ -i & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -i & 0 & 0 \end{bmatrix}, A_{27} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, A_{28} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \\
A_{29} &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & i \\ 0 & 0 & -i & 0 \\ 0 & i & 0 & 0 \\ -i & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, A_{30} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -i \\ 0 & 0 & i & 0 \\ 0 & -i & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, A_{31} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, A_{32} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.
\end{aligned}$$

Matriks-matriks permutasi yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan

matriks M_i adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} M_1 &= \begin{bmatrix} PA & QB \\ C & D \end{bmatrix}, M_2 = \begin{bmatrix} PA & B \\ QC & D \end{bmatrix}, M_3 = \begin{bmatrix} PA & B \\ C & QD \end{bmatrix}, M_4 = \begin{bmatrix} QA & PB \\ C & D \end{bmatrix}, \\ M_5 &= \begin{bmatrix} A & PB \\ QC & D \end{bmatrix}, M_6 = \begin{bmatrix} A & PB \\ C & QD \end{bmatrix}, M_7 = \begin{bmatrix} QA & B \\ PC & D \end{bmatrix}, M_8 = \begin{bmatrix} A & QB \\ PC & D \end{bmatrix}, \\ M_9 &= \begin{bmatrix} A & B \\ PC & QD \end{bmatrix}, M_{10} = \begin{bmatrix} QA & B \\ C & PD \end{bmatrix}, M_{11} = \begin{bmatrix} A & QB \\ C & PD \end{bmatrix}, M_{12} = \begin{bmatrix} A & B \\ QC & PD \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

dengan A, B, C, D merupakan submatriks berukuran 2×2 hasil partisi dari A_k , matriks $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ dan matriks $Q = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$.

Teorema 3.1. Misalkan $A_k \in \mathbb{G}$, maka $A_k A_k^T = A_k^T A_k$ untuk setiap $A_k \in \mathbb{G}$.

Bukti. Pembuktian teorema di atas akan dibagi dalam beberapa kasus, yaitu sebagai berikut.

Kasus 1. Akan dibuktikan bahwa Teorema 3.1 berlaku untuk matriks $A_k \in \mathbb{G}$ yang simetris.

Ambil sebarang matriks $A_k \in \mathbb{G}$ yang simetris.

Berdasarkan Definisi 2.5, jika A_k matriks simetris, maka $A_k = A_k^T$.

Perhatikan bahwa:

$$\begin{aligned} A_k \cdot A_k^T &= A_k \cdot A_k \\ &= A_k^T \cdot A_k. \end{aligned}$$

Jadi terbukti bahwa $A_k A_k^T = A_k^T A_k$ untuk matriks $A_k \in \mathbb{G}$ yang simetris.

Kasus 2. Akan dibuktikan bahwa Teorema 3.1 berlaku untuk matriks A_k yang tidak simetris.

Ambil sebarang matriks $A_k \in \mathbb{G}$ yang tidak simetris.

Karena $A_k = [a_{ij}]$ matriks tidak simetris, maka $A_k^T = [-a_{ij}]$, untuk $i = 1, 2, 3, 4$ dan $j = 1, 2, 3, 4$

Perhatikan bahwa:

$$\begin{aligned} A_k \cdot A_k^T &= [a_{ij}] \cdot [-a_{ij}] \\ &= \left[\sum_{k=1}^n a_{ik} \cdot -a_{kj} \right] \\ &= \left[\sum_{k=1}^n -(a_{ik}) \cdot a_{kj} \right] \\ &= [-a_{ij}] \cdot [a_{ij}] \\ &= A_k^T \cdot A_k. \end{aligned}$$

Jadi terbukti bahwa $A_k A_k^T = A_k^T A_k$ untuk matriks $A_k \in \mathbb{G}$ yang tidak simetris. Berdasarkan kasus 1 dan kasus 2, terbukti untuk setiap $A_k \in \mathbb{G}$, maka $A_k A_k^T = A_k^T A_k$. $\square$

Teorema 3.2. Misalkan $X, Y \in \mathbb{G}$, maka $XY^T = X^TY$ untuk setiap $X, Y \in \mathbb{G}$, dengan syarat X dan Y keduanya matriks simetris atau X dan Y keduanya matriks tidak simetris.

Bukti. Pembuktian Teorema 3.2 dibagi menjadi beberapa kasus berikut.

Kasus 1. Akan dibuktikan Teorema 3.2 berlaku untuk matriks X simetri dan matriks Y simetris.

Berdasarkan Definisi 2.5, jika X matriks simetris, maka $X = X^T$.

Berdasarkan Definisi 2.5, jika Y matriks simetris, maka $Y = Y^T$.

Perhatikan bahwa :

$$\begin{aligned} X \cdot Y^T &= X^T \cdot Y^T \\ &= X^T \cdot Y. \end{aligned}$$

Jadi terbukti bahwa $XY^T = X^TY$ untuk matriks X dan Y keduanya matriks simetris.

Kasus 2. Akan dibuktikan Teorema 3.2 berlaku untuk matriks X tidak simetris dan Y tidak simetris.

Ambil sebarang matriks $X \in \mathbb{G}$ yang tidak simetris, dan matriks $Y \in \mathbb{G}$ yang tidak simetris.

Jika matriks X tidak simetris, maka $X^T = -X = -[x_{ij}]$, untuk $i = 1, 2, 3, 4$ dan $j = 1, 2, 3, 4$

Jika matriks Y tidak simetris, maka $Y^T = -Y = -[y_{ij}]$, untuk $i = 1, 2, 3, 4$ dan $j = 1, 2, 3, 4$

Perhatikan bahwa :

$$\begin{aligned} X \cdot Y^T &= [x_{ij}] \cdot -[y_{ij}] \\ &= \left[\sum_{k=1}^n x_{ik} \cdot -y_{kj} \right] \\ &= \left[-\sum_{k=1}^n x_{ik} \cdot y_{kj} \right] \\ &= -\left[\sum_{k=1}^n x_{ik} \cdot y_{kj} \right] \end{aligned} \tag{3.1}$$

$$\begin{aligned} X^T \cdot Y &= -[x_{ij}] \cdot [y_{ij}] \\ &= \left[\sum_{k=1}^n -x_{ik} \cdot y_{kj} \right] \\ &= \left[-\sum_{k=1}^n x_{ik} \cdot y_{kj} \right] \\ &= -\left[\sum_{k=1}^n x_{ik} \cdot y_{kj} \right] \end{aligned} \tag{3.2}$$

Berdasarkan persamaan-persamaan di atas, karena persamaan (3.1) sama dengan persamaan (3.2), maka terbukti bahwa $XY^T = X^TY$ untuk matriks X dan Y keduanya matriks tidak simetris.

Berdasarkan kasus 1 dan kasus 2, maka terbukti $XY^T = X^TY$ untuk setiap $X, Y \in \mathbb{G}$, dengan syarat X dan Y keduanya matriks simetris atau X dan Y keduanya matriks tidak simetris. $\square$

Teorema 3.3. *Misalkan*

$$X = \begin{bmatrix} A_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad Y = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ 0 & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix}$$

dimana A_{ij} dengan $i = 1, 2, \dots, n$ dan $j = 1, 2, \dots, n$ adalah matriks-matriks di $\mathbb{G}$, maka $X^TX = YY^T$ dengan syarat A_{ij} adalah matriks simetris atau A_{ij} adalah matriks tidak simetris.

Bukti. Ambil sebarang matriks $A_{ij} \in \mathbb{G}$.

$$\text{Matriks } X = \begin{bmatrix} A_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix}, \text{ maka } X^T = \begin{bmatrix} A_{11}^T & A_{21}^T & \cdots & A_{n1}^T \\ 0 & A_{22}^T & \cdots & A_{n2}^T \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_{nn}^T \end{bmatrix},$$

$$\begin{aligned} X^TX &= \begin{bmatrix} A_{11}^T & A_{21}^T & \cdots & A_{n1}^T \\ 0 & A_{22}^T & \cdots & A_{n2}^T \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_{nn}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} A_{11}^T A_{11} + A_{21}^T A_{21} + \cdots + A_{n1}^T A_{n1} & A_{21}^T A_{22} + \cdots + A_{n1}^T A_{n2} & \cdots & A_{n1}^T A_{nn} \\ A_{22}^T A_{21} + \cdots + A_{n2}^T A_{n1} & A_{22}^T A_{22} + \cdots + A_{n2}^T A_{n2} & \cdots & A_{n2}^T A_{nn} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{nn}^T A_{n1} & A_{nn}^T A_{n2} & \cdots & A_{nn}^T A_{nn} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

$$\text{Matriks } Y = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ 0 & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix}, \text{ maka } Y^T = \begin{bmatrix} A_{11}^T & 0 & \cdots & 0 \\ A_{21}^T & A_{22}^T & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n1}^T & A_{n2}^T & \cdots & A_{nn}^T \end{bmatrix},$$

$$\begin{aligned}
YY^T &= \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ 0 & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_{11}^T & 0 & \cdots & 0 \\ A_{21}^T & A_{22}^T & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n1}^T & A_{n2}^T & \cdots & A_{nn}^T \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} A_{11}A_{11}^T + A_{21}A_{21}^T + \cdots + A_{n1}A_{n1}^T & A_{21}A_{22}^T + \cdots + A_{n1}A_{n2}^T & \cdots & A_{n1}A_{nn}^T \\ A_{22}A_{21}^T + \cdots + A_{n2}A_{n1}^T & A_{22}A_{22}^T + \cdots + A_{n2}A_{n2}^T & \cdots & A_{n2}A_{nn}^T \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{nn}A_{n1}^T & A_{nn}A_{n2}^T & \cdots & A_{nn}A_{nn}^T \end{bmatrix}.
\end{aligned}$$

Perhatikan bahwa berdasarkan Teorema 3.1 dan Teorema 3.2

$$\begin{aligned}
X^T X &= \begin{bmatrix} A_{11}^T A_{11} + A_{21}^T A_{21} + \cdots + A_{n1}^T A_{n1} & A_{21}^T A_{22} + \cdots + A_{n1}^T A_{n2} & \cdots & A_{n1}^T A_{nn} \\ A_{22}^T A_{21} + \cdots + A_{n2}^T A_{n1} & A_{22}^T A_{22} + \cdots + A_{n2}^T A_{n2} & \cdots & A_{n2}^T A_{nn} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{nn}^T A_{n1} & A_{nn}^T A_{n2} & \cdots & A_{nn}^T A_{nn} \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} A_{11}A_{11}^T + A_{21}A_{21}^T + \cdots + A_{n1}A_{n1}^T & A_{21}A_{22}^T + \cdots + A_{n1}A_{n2}^T & \cdots & A_{n1}A_{nn}^T \\ A_{22}A_{21}^T + \cdots + A_{n2}A_{n1}^T & A_{22}A_{22}^T + \cdots + A_{n2}A_{n2}^T & \cdots & A_{n2}A_{nn}^T \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{nn}A_{n1}^T & A_{nn}A_{n2}^T & \cdots & A_{nn}A_{nn}^T \end{bmatrix} \\
&= YY^T.
\end{aligned}$$

Berdasarkan pembuktian di atas, maka terbukti bahwa apabila

$$X = \begin{bmatrix} A_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad Y = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ 0 & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix}$$

dimana A_{ij} dengan $i = 1, 2, \dots, n$ dan $j = 1, 2, \dots, n$ adalah matriks-matriks di $\mathbb{G}$, maka $X^T X = YY^T$ dengan syarat A_{ij} adalah matriks simetris atau A_{ij} adalah matriks tidak simetris. $\square$

4. Kesimpulan

Sifat-sifat yang muncul pada pengolahan unsur-unsur matriks suatu grup $\mathbb{G} = \{A_k = [a_{ij}] | i, j = 1, 2, 3, 4, k = 1, 2, \dots, 32\}$ dengan melibatkan matriks partisi dan matriks permutasi serta dengan memperhatikan sifat matriks simetris dan matriks tidak simetris adalah sebagai berikut :

- (1) Untuk setiap matriks $A_k \in \mathbb{G}$, yaitu $A_k = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$, A, B, C, D merupakan submatriks berukuran 2×2 dari A_k . Dan untuk setiap matriks permutasi M_i , $i = 1, 2, \dots, 12$ dengan matriks $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ dan matriks $Q = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, maka jika

matriks $Q = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ bertemu dengan submatriks dari $A_k = [0]$ maka matriks $M_i = A_k$.

- (2) Matriks permutasi $M_4 = M_7 = M_{10}$, $M_1 = M_8 = M_{11}$, $M_2 = M_5 = M_{12}$, dan $M_3 = M_6 = M_9$.
- (3) Untuk setiap $A_k \in \mathbb{G}$, berlaku $A_k A_k^T = A_k^T A_k$.
- (4) Untuk setiap $X, Y \in \mathbb{G}$, berlaku $XY^T = X^T Y$ dengan syarat X dan Y keduanya matriks simetris atau X dan Y keduanya matriks tidak simetris.
- (5) Jika dibentuk matriks segitiga bawah X dengan entri-entrinya adalah matriks-matriks dari $\mathbb{G}$, dan dibentuk matriks segitiga atas Y dengan entri-entrinya adalah matriks-matriks dari $\mathbb{G}$ dengan syarat $A_{ij} = A_{ji}$ untuk $i = 1, 2, \dots, n$ dan $j = 1, 2, \dots, n$ maka berlaku $X^T X = Y Y^T$ dengan syarat semua matriks yang merupakan entri dari X dan Y adalah matriks simetris atau semua matriks yang merupakan entri dari A dan B adalah matriks tidak simetris.

5. Ucapan Terima kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nova Noliza Bakar, M.Si, Bapak Prof. I Made Arnawa, dan Bapak Dr. Effendi yang telah memberikan masukan dan saran sehingga tulisan ini dapat diselesaikan dengan baik.

Daftar Pustaka

- [1] Anton, H. dan Rorres, C. 2004. *Aljabar Linear Elementer; edisi ke-8, terjemahan*. Erlangga, Jakarta.
- [2] Lipschutz, S. and Lipson, M.L. 2001. *Schaum's Outlines Aljabar Linier*, edisi ke-3. Erlangga, Jakarta.
- [3] Jacob, B. 1990. *Linear Algebra*, W.H.Freeman and Company, New York.
- [4] Supranto, J. 1993. *Pengantar Matriks*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- [5] Piziak, R and Odell, P.L. 2007. *Matrix Theory From Generalized Inverses to Jordan Form*, Taylor and Francis Group, Canada.
- [6] Yanita; Helmi, M.R dan Zakiya, A. 2018. Solvability Group From Kronecker Product on the Representation of Quaternion Group. *Akan terbit di Asian Journal of Scientific Science*. <http://docsdrive.com/pdfs/ansinet/ajsr/0000/92123-92123.pdf>.