SIFAT-SIFAT PEMETAAN TERDIFERENSIAL PADA PERMUKAAN REGULAR

ABRAR ZULKAMAR, HARIPAMYU, JENIZON

*Program Studi S1 Matematika,
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas,
Kampus UNAND Limau Manis Padang, Indonesia.
email : zahratulaini35@gmail.com*

Diterima 22 Juni 2019 Direvisi 6 Juli 2019 Dipublikasikan 4 Agustus 2019

Abstrak. Permukaan di $\mathbb{R}^3$ adalah bagian dari $\mathbb{R}^3$ yang terlihat seperti potongan $\mathbb{R}^2$ di sekitar titik tertentu. Jika untuk setiap titik p di suatu permukaan, terdapat suatu homeomorfisma antara lingkungan di $\mathbb{R}^3$ yang memuat p dan suatu himpunan buka di $\mathbb{R}^2$ serta turunannya di suatu titik bersifat satu-satu, maka permukaan tersebut adalah permukaan regular. Jika terdapat dua permukaan regular atau lebih, maka dapat dikonstruksi suatu pemetaan antara kedua permukaan regular tersebut. Pemetaan yang dimaksud adalah pemetaan terdiferensial. Untuk lebih memahami apa itu permukaan terdiferensial pada permukaan regular, pada makalah ini akan dijelaskan definisi dan beberapa sifat pemetaan terdiferensial pada permukaan regular di $\mathbb{R}^3$ beserta contoh.

Kata Kunci: Terdiferensial, Pemetaan, Permukaan Regular

1. Pendahuluan

Geometri Diferensial pada dasarnya merupakan cabang Matematika yang mempelajari lengkungan, permukaan serta umumnya ruang analitik (*manifold*) yang berdimensi lebih tinggi dan sejenis ataupun beranalogi dengan permukaan [3]. Pada geometri diferensial, terdapat dua objek penting yaitu lengkungan dan permukaan. Pada penelitian kali ini, difokuskan untuk membahas permukaan, tepatnya permukaan regular.

Permukaan di $\mathbb{R}^3$ adalah bagian dari $\mathbb{R}^3$ yang terlihat seperti potongan $\mathbb{R}^2$ di sekitar titik tertentu. Sama seperti permukaan bumi, meskipun sebenarnya tampak hampir bulat, namun jika diperhatikan maka akan terlihat seperti bidang datar. Jika untuk setiap titik di suatu permukaan, terdapat lingkungan di $\mathbb{R}^3$ dan suatu pemetaan yang bersifat terdiferensial, homeomorfisma, dan turunannya di suatu titik bersifat satu-satu, maka permukaan tersebut adalah permukaan regular.

Jika terdapat dua permukaan regular atau lebih, maka dapat dikonstruksi suatu pemetaan antara kedua permukaan regular tersebut. Salah satu implikasi yang diperoleh dari konsep ini adalah equivalensi antara permukaan regular yang dikenal dengan difeomorfisma.

Konsep kekontinuan dan keterdiferensialan merupakan hal yang penting dalam kalkulus baik satu variabel maupun beberapa variabel. Pada makalah ini dibahas bagaimana konsep keterdiferensialan pada suatu permukaan regular.

2. Landasan Teori

2.1. Kekontinuan di $\mathbb{R}^m$

Definisi 2.1. [1] Suatu pemetaan $F : U \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ dikatakan kontinu di $p \in U$ jika diberikan $\epsilon > 0$, terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga

$$F(B(p, \delta)) \subset B(F(p), \epsilon).$$

Kemudian pemetaan F dikatakan kontinu jika F kontinu pada setiap titik di U .

Definisi 2.2. [1] Misalkan pemetaan $F : U \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$, dikatakan homeomorfisma jika F kontinu dan $F^{-1} : F(U) \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ juga kontinu. Kemudian U dan $F(U)$ disebut homeomorfik.

2.2. Keterdiferensialan di $\mathbb{R}^m$

Definisi 2.3. [1] Pemetaan $F : U \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$, dimana U suatu himpunan buka di $\mathbb{R}^m$, maka F terdiferensial di $p = (x_1, x_2, \dots, x_m) \in U$ jika setiap fungsi komponen $F(p)$ terdiferensial di p , yaitu

$$F(x_1, \dots, x_m) = (f_1(x_1, \dots, x_m), \dots, f_n(x_1, \dots, x_m)),$$

dimana fungsi f_i , $i = 1, \dots, n$, memiliki turunan parsial yang kontinu di p .

Proposisi 2.4. [1] **Aturan Rantai untuk Pemetaan** Misalkan : $U \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ dan $G : V \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$ adalah pemetaan terdiferensial, dimana U dan V adalah himpunan buka, sedemikian sehingga $F(U) \subset V$. Kemudian $G \circ F : U \rightarrow \mathbb{R}^k$ adalah pemetaan terdiferensial, dan

$$d(G \circ F)_p = dG_{F(p)} \circ dF_p, \quad p \in U.$$

Definisi 2.5. [3] Jika $U, V \subset \mathbb{R}^m$ buka dan $F : U \rightarrow V$, maka F disebut difeomorfisma jika F terdiferensial dan mempunyai invers $F^{-1} : V \rightarrow U$ yang juga terdiferensial. Kemudian U dan V dikatakan difeomorfik.

Teorema 2.6. [1] **(Teorema Fungsi Invers)** Misalkan $F : U \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ adalah pemetaan terdiferensial dan misalkan untuk $p \in U$, dF_p adalah isomorfisma. Maka terdapat suatu lingkungan V dari p di U dan suatu lingkungan W dari $F(p)$ di $\mathbb{R}^m$ sedemikian sehingga $F : V \rightarrow W$ mempunyai invers yaitu $F^{-1} : W \rightarrow V$ yang terdiferensial.

Bukti. Lihat [1]

□

2.3. Permukaan Regular

Definisi 2.7. [1] Himpunan $S \subset \mathbb{R}^3$ disebut suatu permukaan regular jika untuk setiap $p \in S$, terdapat lingkungan V di $\mathbb{R}^3$ dan suatu pemetaan $\mathbf{x} : U \rightarrow V \cap S$ dari himpunan buka $U \subset \mathbb{R}^2$ pada $V \cap S \subset \mathbb{R}^3$, sedemikian sehingga

(1) $\mathbf{x}$ terdiferensial, yaitu didefinisikan sebagai berikut

$$\mathbf{x}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)), (u, v) \in U.$$

dimana fungsi $x(u, v), y(u, v), z(u, v)$ memiliki turunan parsial yang kontinu pada U .

(2) $\mathbf{x} : U \rightarrow V \cap S$ homeomorfisma.

(3) Untuk setiap $q \in U$, diferensial $d\mathbf{x}_q : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ satu-satu.

Pemetaan $\mathbf{x}$ disebut parameterisasi pada lingkungan dari p . Lingkungan $V \cap S$ dari p di S disebut lingkungan koordinat.

Contoh 2.8. Akan ditunjukkan suatu silinder vertikal yaitu

$$C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 = 1\},$$

adalah suatu permukaan regular. Misalkan suatu parameterisasi $\mathbf{x}_1 : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ didefinisikan oleh

$$\mathbf{x}_1(y, z) = (\sqrt{1 - y^2}, y, z), (y, z) \in U,$$

dimana $U = \{(y, z) \mid -1 < y < 1\}$.

Pertama akan ditunjukkan kondisi 1 terpenuhi yaitu $\mathbf{x}_1$ terdiferensial. Jelas y dan z mempunyai turunan parsial yang kontinu. Misalkan $\sqrt{1 - y^2} = x$. Perhatikan bahwa

$$\frac{\partial x}{\partial y} = \frac{-2y}{\sqrt{1 - y^2}}$$

adalah fungsi yang kontinu untuk $-1 < y < 1$. Oleh karena itu, $\mathbf{x}_1$ terdiferensial dan kondisi 1 terpenuhi.

Selanjutnya kondisi 3 terpenuhi karena determinan dari salah satu jacobian tidak sama dengan nol. Kemudian akan dibuktikan kondisi 2 yaitu $\mathbf{x}_1$ homeomorfisma. Berdasarkan kondisi 1 dan 3 diketahui bahwa $\mathbf{x}_1$ terdiferensial dan $d\mathbf{x}_q$ satu-satu. Misalkan $\mathbf{x}_1$ satu-satu dan $\mathbf{x}_1^{-1}$ adalah restriksi dari proyeksi $\pi(x, y, z) = (x, y)$ pada himpunan $\mathbf{x}_1(U)$, maka $\mathbf{x}_1^{-1}$ kontinu pada $\mathbf{x}_1(U)$. Karena $\mathbf{x}_1(U)$ hanya menyelimuti C pada bagian depan, maka dibutuhkan parameterisasi lain sehingga C terselimuti secara keseluruhan.

Definisikan

$$\mathbf{x}_2(x, y) = (-\sqrt{1 - y^2}, y, z),$$

$$\mathbf{x}_3(x, z) = (x, \sqrt{1 - x^2}, z),$$

$$\mathbf{x}_4(x, z) = (x, -\sqrt{1 - x^2}, z).$$

Dengan menggunakan cara yang sama seperti pada $\mathbf{x}_1$ atau $\mathbf{x}_2$, diperoleh parameterisasi pada bidang (x, y) memenuhi kondisi 1, 2, dan 3 pada Definisi 2.7 serta

$\mathbf{x}_1(U)$ sampai $\mathbf{x}_4(U)$ menyelimuti C secara keseluruhan. Akibatnya, C adalah suatu permukaan regular.

3. Pembahasan

3.1. Pemetaan Terdiferensial pada Permukaan Regular

Definisi dari keterdiferensialan dapat diperluas menjadi pemetaan terdiferensial antara permukaan regular.

Definisi 3.1. [1] Misalkan S_1, S_2 suatu permukaan regular. Suatu pemetaan kontinu $\varphi : S_1 \rightarrow S_2$ dikatakan terdiferensial di $p \in S_1$, jika terdapat himpunan buka $\mathbf{x}_1(U_1)$ yang memuat p dan himpunan buka $\mathbf{x}_2(U_2)$ yang memuat $\varphi(p)$ dengan

$$\mathbf{x}_1 : U_1 \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow S_1 \quad \mathbf{x}_2 : U_2 \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow S_2,$$

sedemikian sehingga $\varphi(\mathbf{x}_1(U_1)) \subset \mathbf{x}_2(U_2)$, pemetaan

$$\mathbf{x}_2^{-1} \circ \varphi \circ \mathbf{x}_1 : U_1 \rightarrow U_2$$

terdiferensial pada U_1 .

Contoh 3.2. Suatu pemetaan kontinu $\varphi : S^2 \rightarrow M_g$ didefinisikan oleh $\varphi(x, y, z) = (xa, yb, zc)$ dimana $a, b, c \in \mathbb{R}$. Akan ditunjukkan φ terdiferensial di $p \in S_1$ dengan menunjukkan $\mathbf{x}_2^{-1} \circ \varphi \circ \mathbf{x}_1 : U_1 \rightarrow U_2$ terdiferensial di U_1 . Misalkan diberikan parameterisasi

$$\mathbf{x}_1 : U_1 \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow S^2, \mathbf{x}_2 : U_2 \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow M_g,$$

dengan $\mathbf{x}_1(x, y) = (x, y, \sqrt{1 - (x^2 + y^2)})$ dimana $(x, y) \in U_1$ dan $U_1 = \{(x_1, y_1) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1^2 + y_1^2 < 1\}$.

Perhatikan bahwa

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_2^{-1} \circ \varphi \circ \mathbf{x}_1(x, y) &= \mathbf{x}_2^{-1}(\varphi(\mathbf{x}_1(x, y))) \\ &= \mathbf{x}_2^{-1}(\varphi(x, y, \sqrt{1 - (x^2 + y^2)})) \\ &= \mathbf{x}_2^{-1}(xa, yb, \sqrt{1 - (x^2 + y^2)}) \\ &= (xa, yb). \end{aligned}$$

Jelas xa dan yb mempunyai turunan parsial yang kontinu di titik x dan y , maka $(\mathbf{x}_2^{-1} \circ \varphi \circ \mathbf{x}_1)$ terdiferensial pada U_1 . Oleh karena itu, φ terdiferensial di $p \in S_1$.

Contoh 3.3. Misalkan pemetaan kontinu $\varphi : M_g \rightarrow C$ yang didefinisikan oleh

$$\varphi(x, y, z) = (x, x + y, zx).$$

Akan ditunjukkan φ terdiferensial di $p \in M_g$ dengan menunjukkan $\mathbf{x}_2^{-1} \circ \varphi \circ \mathbf{x}_1 : U_1 \rightarrow U_2$ terdiferensial di U_1 . Misalkan diberikan parameterisasi

$$\mathbf{x}_1 : U_1 \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow M_g, \mathbf{x}_2 : U_2 \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow C,$$

dengan $\mathbf{x}_1(x, y) = (x, y, g(x, y))$ dan $\mathbf{x}_2(x, z) = (x, \sqrt{1 - x^2}, z)$ jika dan hanya jika $\mathbf{x}_2^{-1}(x, \sqrt{1 - x^2}, z) = (x, z)$, dimana $U_2 = \{(x, z) \mid |x| < 1\}$.

Perhatikan bahwa

$$\begin{aligned}\mathbf{x}_2^{-1} \circ \varphi \circ \mathbf{x}_1(x, y) &= \mathbf{x}_2^{-1}(\varphi(\mathbf{x}_1(x, y))) \\ &= \mathbf{x}_2^{-1}(\varphi(x, y, g(x, y))) \\ &= \mathbf{x}_2^{-1}(x, x + y, xg(x, y)) \\ &= (x, xg(x, y)).\end{aligned}$$

Jelas x dan $xg(x, y)$ terdiferensial di x dan y maka $(\mathbf{x}_2^{-1} \circ \varphi \circ \mathbf{x}_1)$ terdiferensial pada U_1 . Oleh karena itu, φ terdiferensial di $p \in M_g$.

Teorema 3.4. [2] Misalkan $\varphi_1 : S_1 \rightarrow S_2$ dan $\varphi_2 : S_2 \rightarrow S_3$ adalah pemetaan terdiferensial, dimana S_1, S_2, S_3 suatu permukaan regular. Maka pemetaan komposisi $\varphi_3 = \varphi_2 \circ \varphi_1 : S_1 \rightarrow S_3$ juga terdiferensial.

Bukti. Misalkan S_1, S_2, S_3 suatu permukaan regular dan $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3$ suatu parameterisasi dari S_1, S_2, S_3 yang didefinisikan oleh

$$\mathbf{x}_1 : U_1 \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow S_1, \mathbf{x}_2 : U_2 \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow S_2, \mathbf{x}_3 : U_3 \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow S_3,$$

dimana U_1, U_2, U_3 himpunan buka di $\mathbb{R}^2$. Akan dibuktikan φ_3 terdiferensial di S_1 .

Misalkan $\varphi_1 : S_1 \rightarrow S_2$, $\varphi_2 : S_2 \rightarrow S_3$ adalah pemetaan terdiferensial dan misalkan $p \in S_1$. Karena φ_2 terdiferensial, maka $\mathbf{x}_3^{-1} \circ \varphi_2 \circ \mathbf{x}_2 : U_2 \rightarrow U_3$ terdiferensial. Karena φ_1 terdiferensial, maka $\mathbf{x}_2^{-1} \circ \varphi_1 \circ \mathbf{x}_1 : U_1 \rightarrow U_2$ terdiferensial dan φ_1 kontinu. Akibat dari φ_1 kontinu, $\varphi_1^{-1}(\mathbf{x}_2(U_2))$ adalah lingkungan dari $p \in S_1$, maka terdapat himpunan buka $\mathbf{x}_1(U_1) \subset S_1$, sedemikian sehingga $p \in \mathbf{x}_1(U_1) \subset \varphi_1^{-1}(\mathbf{x}_2(U_2))$. Kemudian $\varphi_2 \circ (\varphi_1(\mathbf{x}_1(U_1))) \subset \varphi_2(\mathbf{x}_2(U_2)) \subset \mathbf{x}_3(U_3)$ dan

$$\mathbf{x}_3^{-1} \circ (\varphi_2 \circ \varphi_1) \circ \mathbf{x}_1 = (\mathbf{x}_3^{-1} \circ \varphi_2 \circ \mathbf{x}_2) \circ (\mathbf{x}_2^{-1} \circ \varphi_1 \circ \mathbf{x}_1) : U_1 \rightarrow U_3$$

terdiferensial karena komposisi dari pemetaan terdiferensial. Terbukti φ_3 terdiferensial di S_1 . $\square$

Contoh 3.5. Misalkan $\varphi_1 : S^2 \rightarrow M_g$ dan $\varphi_2 : M_g \rightarrow C$ terdiferensial dengan $\varphi_1(x_1, y_1, z_1) = (x_1a, y_1b, z_1c)$ dan $\varphi_2(x_2, y_2, z_2) = (x_2, x_2 + y_2, z_2x_2)$. Akan ditunjukkan $\varphi_2 \circ \varphi_1 : S^2 \rightarrow C$ juga terdiferensial. Karena φ_1 dan φ_2 terdiferensial maka berdasarkan Teorema 3.4, $\varphi_2 \circ \varphi_1$ juga terdiferensial.

Misalkan $p = (x_1, y_1, z_1) \in S^2$. Perhatikan bahwa

$$\begin{aligned}\varphi_2 \circ \varphi_1(x_1, y_1, z_1) &= \varphi_2(x_1a, y_1b, z_1c), \\ &= (x_1a, x_1a + y_1b, (z_1c)(x_1a)).\end{aligned}$$

Karena $(x_1a, x_1a + y_1b, (z_1c)(x_1a))$ mempunyai turunan parsial yang kontinu, maka $\varphi_2 \circ \varphi_1$ terdiferensial.

Teorema fungsi invers dapat diperluas pada pemetaan terdiferensial antara permukaan regular. Hal ini mengakibatkan terdapat suatu sifat dari pemetaan terdiferensial antara permukaan regular yaitu difeomorfisma lokal. Untuk itu, didefinisikan suatu difeomorfisma lokal.

Definisi 3.6. [1] Misalkan S_1 dan S_2 adalah permukaan regular. Suatu pemetaan $\varphi : U \subset S_1 \rightarrow S_2$ adalah difeomorfisma lokal di $p \in U$ jika terdapat suatu lingkungan $V \subset U$ di p sedemikian sehingga $\varphi : V \rightarrow \varphi(V)$ adalah difeomorfisma.

Proposisi 3.7. [1] Jika S_1 dan S_2 adalah permukaan regular dan $\varphi : U \subset S_1 \rightarrow S_2$ adalah pemetaan terdiferensial pada himpunan buka $U \subset S_1$ sedemikian sehingga $d\varphi_p$ adalah isomorfisma, maka φ adalah difeomorfisma lokal di p .

Bukti. Dengan menggunakan Teorema 2.6, karena φ terdiferensial dan $d\varphi_p$ suatu isomorfisma maka terdapat lingkungan V dari p di U dan lingkungan $\varphi(V)$ dari $\varphi(p)$ di S_2 sedemikian sehingga $\varphi : V \rightarrow \varphi(V)$ terdiferensial dan mempunyai $\varphi^{-1} : \varphi(V) \rightarrow V$ yang terdiferensial. Karena φ dan φ^{-1} terdiferensial maka φ difeomorfisma, sedemikian sehingga φ difeomorfisma lokal di $p \in U$. $\square$

Contoh 3.8. Misalkan C dan S^2 suatu permukaan regular. Diberikan pemetaan terdiferensial $\varphi : U \subset C \rightarrow S^2$ dengan $\varphi(x, y, z) = (x, y, \sqrt{1 - (x^2 + y^2)})$ dimana $U = \{(x, y, z) \mid |x| < 1\}$. Misalkan $p \in U$, akan dibuktikan φ difeomorfisma lokal di $p \in U$.

Misalkan $p \in U$. Pertama akan ditunjukkan $d\varphi_p$ isomorfisma dengan menunjukkan $\det(d\varphi_p) \neq 0$. Karena $\det(d\varphi(p)) \neq 0$, maka $d\varphi(p)$ satu-satu. Oleh karena itu, $d\varphi_p$ isomorfisma. Berdasarkan Teorema 2.6, $\varphi : V \rightarrow \varphi(V)$ terdiferensial dan mempunyai $\varphi^{-1} : \varphi(V) \rightarrow V$ yang terdiferensial. Karena φ dan φ^{-1} terdiferensial maka φ difeomorfisma, sedemikian sehingga φ difeomorfisma lokal di $p \in U$.

4. Kesimpulan

Dari pembahasan pada tugas akhir ini diperoleh kesimpulan yaitu jika diketahui S_1, S_2, S_3 suatu permukaan regular, $\varphi_1 : S_1 \rightarrow S_2$ dan $\varphi_2 : S_2 \rightarrow S_3$ yang terdiferensial, maka $\varphi_3 = \varphi_2 \circ \varphi_1 : S_1 \rightarrow S_3$ juga terdiferensial. Kemudian jika S_1 dan S_2 adalah permukaan regular dan $\varphi : U \subset S_1 \rightarrow S_2$ adalah pemetaan terdiferensial pada himpunan buka $U \subset S_1$ sedemikian sehingga $d\varphi_p$ adalah isomorfisma, maka φ adalah difeomorfisma lokal di p .

5. Ucapan Terima kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. I Made Arnawa, Bapak Efendi, M.Si, dan Bapak Dr. Dodi Devianto yang telah memberikan masukan dan saran sehingga makalah ini dapat diselesaikan dengan baik.

Daftar Pustaka

- [1] Carmo, M. P. do. 1976. *Differential Geometry of Curves and Surface*. Prentice-Hall, New Jersey.
- [2] Montiel, Sebastian dan Antonio Ros. 2005. *Curves and Surfaces*. American Mathematical Society, United States of America.
- [3] Pranoto, Iwan. 2004. *Pengenalan Geometri Differensial*. Institut Teknologi Bandung, Bandung.
- [4] Pressley, Andrew. 2001. *Elementary Differential Geometry*. Springer, London.