PENERAPAN ANALISIS REGRESI MULTIVARIAT UNTUK MENGANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSENTASE *UNDERWEIGHT* DAN *STUNTING* DI INDONESIA

DWI MALAHAYATI, IZZATI RAHMI HG, HAZMIRA YOZZA

*Program Studi S1 Matematika,
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas,
Kampus UNAND Limau Manis Padang, Indonesia.
email : dwimalahayati39@gmail.com*

Diterima 22 Juni 2019 Direvisi 6 Juli 2019 Dipublikasikan 4 Agustus 2019

Abstrak. Status gizi merupakan faktor penting yang mempengaruhi derajat kesehatan. Masalah gizi utama yang dihadapi Indonesia saat ini adalah kejadian balita *underweight* dan *stunting*. Untuk menanggulangi masalah *underweight* dan *stunting* ini, pemerintah membuat beberapa program gizi dan sudah dilaksanakan secara menyeluruh dan kontinu di Indonesia. Namun, program tersebut belum memberikan hasil yang optimal. Oleh karena itu, perlu dianalisis program gizi yang berpengaruh signifikan terhadap persentase *underweight* dan *stunting* pada balita di Indonesia. Proses analisis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi multivariat. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa program gizi yang berpengaruh signifikan terhadap persentase *underweight* dan *stunting* pada balita di Indonesia adalah persentase bayi mendapat ASI eksklusif, persentase balita kurus mendapat makanan tambahan, persentase ibu hamil risiko KEK, persentase wanita usia subur risiko KEK, dan persentase rumah tangga mengonsumsi garam beriodium.

Kata Kunci: *Underweight, Stunting, Program Gizi, Analisis Regresi Multivariat*

1. Pendahuluan

Status gizi merupakan faktor penting yang mempengaruhi derajat kesehatan. Status gizi yang baik dapat membantu proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Permasalahan yang terjadi di Indonesia sampai sekarang adalah kasus gizi buruk pada balita yang masih tergolong parah, dimana Indonesia menempati urutan ke-108 di dunia dengan kasus gizi buruk terbanyak.

Masalah gizi utama yang dihadapi Indonesia saat ini adalah kejadian balita *underweight* dan *stunting*. Berdasarkan data Pemantauan Status Gizi Indonesia tahun 2017, masalah gizi balita di Indonesia masih tinggi, yaitu 17,8% untuk kasus *underweight* dan 29,6% untuk kasus *stunting*. Berdasarkan standar WHO, suatu wilayah dikatakan baik jika persentase *underweight* < 10% dan *stunting* < 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi masalah *under-*

weight dan *stunting* pada balita di Indonesia. Salah satunya dengan mendeteksi indikator program gizi yang menjadi peubah penciri pada *underweight* dan *stunting*. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk memodelkan pengaruh indikator program gizi terhadap persentase *underweight* dan *stunting* adalah analisis regresi multivariat.

2. Landasan Teori

2.1. Status Gizi

Status gizi merupakan suatu ukuran mengenai kondisi tubuh seseorang yang dapat dilihat dari makanan yang dikonsumsi dan penggunaan zat-zat gizi di dalam tubuh. Salah satu penilaian status gizi didasarkan pada Berat Badan menurut Umur (BB/U). Berdasarkan indikator BB/U, status gizi dibagi menjadi gizi buruk, gizi kurang, gizi baik, dan gizi lebih. Gabungan antara gizi buruk dan gizi kurang disebut dengan *underweight*. Selain indikator BB/U, penilaian status gizi juga didasarkan pada Tinggi Badan menurut Umur (TB/U). Berdasarkan indikator TB/U, status gizi dibagi menjadi sangat pendek, pendek, dan normal. Seorang anak yang gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis, sehingga tinggi anak terlalu pendek untuk usianya disebut *stunting*.

2.2. Analisis Regresi Multivariat

Analisis regresi multivariat merupakan analisis regresi yang dilakukan apabila terdapat lebih dari satu variabel respon. Jika terdapat variabel respon sebanyak q dan variabel prediktor sebanyak p , maka model regresi multivariat untuk pengamatan ke- i respon ke- j adalah [4]:

$$\begin{aligned} Y_{i1} &= \beta_{01} + \beta_{11}X_{i1} + \beta_{21}X_{i2} + \cdots + \beta_{p1}X_{ip} + \epsilon_{i1}, \\ Y_{i2} &= \beta_{02} + \beta_{12}X_{i1} + \beta_{22}X_{i2} + \cdots + \beta_{p2}X_{ip} + \epsilon_{i2}, \\ &\vdots \\ Y_{iq} &= \beta_{0q} + \beta_{1q}X_{i1} + \beta_{2q}X_{i2} + \cdots + \beta_{pq}X_{ip} + \epsilon_{iq}. \end{aligned}$$

Model regresi multivariat yang terdiri atas q model linear secara simultan dapat ditunjukkan secara matriks dalam persamaan :

$$\mathbf{Y}_{(n \times q)} = \mathbf{X}_{n \times (p+1)} \boldsymbol{\beta}_{(p+1) \times q} + \boldsymbol{\epsilon}_{(n \times q)}. \quad (2.1)$$

Estimasi kuadrat terkecil dari $\hat{\boldsymbol{\beta}}$ sebagai berikut [5]:

$$\hat{\boldsymbol{\beta}} = (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{Y}. \quad (2.2)$$

2.2.1. Pengujian Korelasi Antar Variabel Respon

Variabel $Y_1, Y_2, \dots, Y_q$ dikatakan saling berkorelasi jika antar variabel respon bersifat tidak saling bebas. Untuk menguji kebebasan antar variabel respon dapat menggunakan uji *Bartlett Sphericity* dengan hipotesis :

H_0 : Antar variabel respon bersifat saling bebas,

H_1 : Antar variabel respon bersifat tidak saling bebas,

dimana q adalah banyak variabel respon dan $\mathbf{R}$ adalah matriks korelasi dari semua variabel respon. Statistik uji yang digunakan adalah

$$\chi_{hitung}^2 = - \left\{ n - 1 - \frac{2q + 5}{6} \right\} \ln |\mathbf{R}|. \quad (2.3)$$

H_0 akan ditolak jika $\chi_{hitung}^2 > \chi_{\alpha, \frac{1}{2}q(q-1)}^2$, artinya antar variabel respon bersifat tidak saling bebas. Ini berarti antar variabel respon saling berkorelasi sehingga dapat digunakan analisis regresi multivariat.

2.2.2. Pengujian Multikolinearitas

Model regresi multivariat yang baik seharusnya tidak terjadi multikolinearitas. Deteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi multivariat dapat dilihat dari besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) dan tolerance. Nilai VIF ditentukan dengan rumus sebagai berikut :

$$VIF = \frac{1}{Tolerance}. \quad (2.4)$$

Regresi multivariat bebas dari multikolinearitas jika besar nilai $VIF < 10$ dan nilai $tolerance > 0,10$ [2].

2.2.3. Kullback's Information Criterion Corrected (KICc)

Pemilihan model regresi multivariat dapat menggunakan kriteria KICc (*Kullbacks Information Criterion Corrected*). Kriteria pemilihan model terbaik metode ini adalah model dengan nilai KICc terkecil di antara semua kemungkinan model. Nilai KICc ditentukan dengan rumus sebagai berikut [3]:

$$KICc = n(\ln |\hat{\Sigma}| + q) + \frac{d(3n - p - q - 1)}{n - p - q - 1} \quad (2.5)$$

dengan:

$$d = qp + 0,5q(q + 1),$$

$$q = \text{banyak variabel respon},$$

$$p = \text{banyak variabel prediktor},$$

$$n = \text{banyak pengamatan},$$

$$\hat{\Sigma} = \text{estimasi matriks varian-kovarian galat (error)}.$$

2.3. Pengujian Signifikansi Model

2.3.1. Pengujian Signifikansi Model Secara Serentak

Hipotesis yang digunakan pada pengujian ini adalah:

$$H_0 : \beta_{kj} = 0, \quad k = 1, 2, \dots, p, j = 1, 2, \dots, q,$$

$$H_1 : \text{paling sedikit ada satu } \beta_{kj} \neq 0.$$

Statistik uji yang digunakan adalah

$$V_{hitung} = - \left[(n-1) - \frac{p+q+1}{2} \right] \ln \Lambda, \quad (2.6)$$

dimana besaran *Wilk's Lambda* didefinisikan sebagai berikut :

$$\Lambda = \frac{|\mathbf{Y}^T \mathbf{Y} - \hat{\beta} \mathbf{X}^T \mathbf{Y}|}{|\mathbf{Y}^T \mathbf{Y} - n \bar{\mathbf{y}} \bar{\mathbf{y}}^T|}, \quad (2.7)$$

dengan $\bar{\mathbf{y}}$ adalah vektor rata-rata variabel respon. H_0 ditolak jika $V_{hitung} > \chi_{v=pq}^2$, artinya ada parameter yang tidak sama dengan nol sehingga model signifikan [1].

2.3.2. Pengujian Signifikansi Model Secara Parsial

Setiap variabel prediktor X_k ; $k = 1, 2, \dots, p$ akan dilakukan pengujian untuk melihat pengaruh setiap variabel prediktor terhadap variabel respon secara parsial. Hipotesis yang digunakan adalah :

$$\begin{aligned} H_0 : \beta_{kj} &= 0, \quad j = 1, 2, \dots, q, \\ H_1 : \beta_{kj} &\neq 0, \quad j = 1, 2, \dots, q. \end{aligned}$$

Statistik uji dan kriteria uji yang digunakan sama seperti pengujian secara serentak, tetapi pada pengujian ini hanya untuk menguji variabel terpilih secara parsial [4].

2.4. Pengujian Asumsi

2.4.1. Pengujian Kesamaan Matriks Ragam Peragam Galat

Pengujian asumsi kesamaan matriks ragam peragam galat dilakukan dengan menggunakan uji Box M. Pada pengujian ini data dibagi menjadi beberapa kelompok. Hipotesis yang digunakan adalah :

$$\begin{aligned} H_0 : \Sigma_1 &= \Sigma_2 = \dots = \Sigma_k, \\ H_1 : \Sigma_i &\neq \Sigma_j \text{ untuk } i \neq j. \end{aligned}$$

Statistik uji yang digunakan adalah [4]:

$$\chi_{hitung}^2 = (1-c)M, \quad (2.8)$$

dengan :

$$\begin{aligned} M &= \left[\sum_{i=1}^k (n_i - 1) \right] \ln |\mathbf{S}| - \sum_{i=1}^k (n_i - 1) \ln |\mathbf{S}_i|, \\ \mathbf{S} &= \frac{1}{\sum_{i=1}^k (n_i - 1)} \sum_{i=1}^k (n_i - 1) \mathbf{S}_i, \\ c &= \left[\frac{2q^2 + 3q - 1}{6(q+1)(k-1)} \right] \left[\sum_{i=1}^k \frac{1}{n_i - 1} - \frac{1}{\sum_{i=1}^k (n_i - 1)} \right], \end{aligned}$$

dimana :

$\mathbf{S}_i$: Matriks ragam peragam untuk kelompok ke $-i$, $i = 1, 2, \dots, k$,

n_i : Ukuran contoh kelompok ke $-i$,

$\mathbf{S}$: Matriks kombinasi ragam peragam dan gabungan dari setiap kelompok,

k : banyak kelompok,

q : banyak variabel galat.

H_0 akan diterima jika $\chi_{hitung}^2 \leq \chi_{\alpha, \frac{1}{2}(k-1)q(q+1)}^2$. Hal ini berarti matriks ragam peragam galat dari k kelompok adalah sama (homogen) [1].

2.4.2. Pengujian Kenormalan Galat

Pengujian normal multivariat pada galat dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut.

H_0 : galat terdistribusi normal multivariat,

H_1 : galat tidak terdistribusi normal multivariat.

Statistik uji yang digunakan adalah

$$d_i^2 = (\mathbf{e}_i - \bar{\mathbf{e}})^T \mathbf{S}^{-1} (\mathbf{e}_i - \bar{\mathbf{e}}), i = 1, 2, \dots, n, \quad (2.9)$$

dimana:

$\mathbf{e}_i$: vektor sisaan pengamatan ke $-i$,

$\bar{\mathbf{e}}$: vektor rata-rata sisaan,

$\mathbf{S}^{-1}$: invers matriks kovarian sisaan berukuran $q \times q$.

Jika dari sampel berukuran n terdapat lebih dari $\frac{1}{2}n$ sampel yang memenuhi kondisi $d_i^2 \leq \chi_{\frac{1}{2}, q}^2$, maka H_0 diterima [1].

3. Metode Penelitian

3.1. Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari hasil Pemantauan Status Gizi tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Direktorat Gizi Masyarakat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan. Dalam penelitian ini, pengamatan dilakukan terhadap 458 kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

3.2. Variabel Penelitian

Variabel respon yang digunakan dalam penelitian adalah persentase *underweight* (Y_1) dan *stunting* (Y_2). Adapun variabel prediktor yang digunakan adalah persentase bayi mendapat ASI eksklusif (X_1), persentase balita mendapat kapsul vitamin A (X_2), persentase balita kurus mendapat makanan tambahan (X_3), persentase balita ditimbang 4 kali atau lebih dalam 6 bulan terakhir (X_4), persentase ibu hamil risiko KEK (X_5), persentase wanita usia subur risiko KEK (X_6), persentase ibu hamil risiko KEK mendapat makanan tambahan (X_7), dan persentase rumah tangga mengonsumsi garam beriodium (X_8).

3.3. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut.

- (1) Mendeskripsikan data variabel respon dan variabel prediktor secara umum.
- (2) Menguji korelasi antar variabel respon.
- (3) Melakukan pengujian multikolinearitas.
- (4) Melakukan analisis regresi multivariat dengan langkah-langkah:
 - (a) Membentuk semua kemungkinan model.
 - (b) Menghitung nilai KICc untuk setiap kemungkinan model.
 - (c) Melakukan pemilihan model terbaik.
 - (d) Melakukan pengujian signifikansi model regresi multivariat.
 - (e) Melakukan pengujian asumsi kesamaan matriks ragam peragam dan kenormalan galat.
 - (f) Menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap persentase *underweight* dan *stunting* di Indonesia.

4. Pembahasan

4.1. Korelasi Antar Variabel Respon

Jika menggunakan uji Bartlett Sphericity hasilnya dapat dilihat sebagai berikut dengan hipotesis :

H_0 : Antar variabel respon bersifat saling bebas,

H_1 : Antar variabel respon bersifat tidak saling bebas.

Statistik uji yang diperoleh:

$$\chi_{hitung}^2 = 330,095.$$

Karena χ_{hitung}^2 lebih besar dari $\chi_{0,05;1}^2$ sebesar 3,841 maka disimpulkan tolak H_0 , yang artinya antar variabel respon bersifat tidak saling bebas. Ini berarti antar variabel respon saling berkorelasi sehingga dapat digunakan analisis regresi multivariat.

4.2. Pengujian Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 1.

Karena semua variabel prediktor memiliki nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel prediktor, sehingga dapat digunakan analisis regresi multivariat.

4.3. Pembentukan Model Regresi Multivariat Tahap I

4.3.1. Pemilihan Model Terbaik

Pemilihan model terbaik menggunakan kriteria KICc yang nilainya diperoleh dengan *software Minitab* menggunakan persamaan (2.5). Hasilnya dapat dilihat pada Tabel 2. Berdasarkan Tabel 2 diperoleh model terbaik dengan satu variabel prediktor sampai delapan variabel prediktor seperti yang terlihat pada Tabel 3.

Tabel 1. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Persentase bayi mendapat ASI eksklusif (X_1)	0,877	1,140
Persentase balita mendapat kapsul vitamin A (X_2)	0,581	1,723
Persentase balita kurus mendapat makanan tambahan (X_3)	0,729	1,372
Persentase balita ditimbang 4 kali atau lebih dalam 6 bulan terakhir (X_4)	0,528	1,894
Persentase ibu hamil risiko KEK (X_5)	0,421	2,377
Persentase wanita usia subur risiko KEK (X_6)	0,409	2,445
Persentase ibu hamil risiko KEK mendapat makanan tambahan (X_7)	0,868	1,152
Persentase rumah tangga mengonsumsi garam beriodium (X_8)	0,961	1,041

Tabel 2. Hasil Perhitungan KICc dari Semua Kemungkinan Model

No	Prediktor	KICc	No	Prediktor	KICc
1	X_1	4101,19	116	$X_1 X_3 X_6 X_8$	3985,39
2	X_2	4100,39	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
3	X_3	4067,32	163	$X_1 X_2 X_3 X_4 X_5$	4023,08
4	X_4	4111,27	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	190	$X_1 X_3 X_5 X_6 X_8$	3985,68
9	$X_1 X_2$	4093,19	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	219	$X_1 X_2 X_3 X_4 X_5 X_6$	4010,44
24	$X_3 X_6$	4019,73	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	238	$X_1 X_3 X_5 X_6 X_7 X_8$	3789,02
37	$X_1 X_2 X_3$	4062,75	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	247	$X_1 X_2 X_3 X_4 X_5 X_6 X_7$	4014,14
45	$X_1 X_3 X_6$	4000,38	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	253	$X_1 X_3 X_4 X_5 X_6 X_7 X_8$	3994,65
93	$X_1 X_2 X_3 X_4$	4060,87	254	$X_2 X_3 X_4 X_5 X_6 X_7 X_8$	4020,28
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	255	$X_1 X_2 X_3 X_4 X_5 X_6 X_7 X_8$	4000,35

Berdasarkan Tabel 3 terlihat bahwa nilai KICc terkecil adalah 3789,02 yaitu model dengan variabel prediktor $X_1, X_3, X_5, X_6, X_7, X_8$. Persamaan model regresi

Tabel 3. Model Terbaik Untuk Setiap Banyak Variabel Prediktor yang Digunakan

Banyak Variabel	Variabel pada Model Terbaik	KICc
1	X_3	4067,32
2	X_3X_6	4019,73
3	$X_1X_3X_6$	4000,38
4	$X_1X_3X_6X_8$	3985,39
5	$X_1X_3X_5X_6X_8$	3985,68
6	$X_1X_3X_5X_6X_7X_8$	3789,02
7	$X_1X_3X_4X_5X_6X_7X_8$	3994,65
8	$X_1X_2X_3X_4X_5X_6X_7X_8$	4000,35

multivariat yang terbentuk adalah sebagai berikut :

$$Y_1 = 27,655 - 0,090X_1 - 0,069X_3 + 0,128X_5 + 0,293X_6 + 0,017X_7 - 0,078X_8,$$

$$Y_2 = 36,646 - 0,058X_1 - 0,081X_3 + 0,031X_5 + 0,345X_6 + 0,027X_7 - 0,048X_8.$$

4.3.2. Pengujian Signifikansi Model

(1) Pengujian Signifikansi Model Secara Serentak.

Dalam pengujian signifikansi model secara serentak digunakan hipotesis sebagai berikut.

$$H_0 : \beta_{pq} = 0; \quad p = 1, 3, 5, 6, 7, 8, \quad q = 1, 2.$$

$$H_1 : \text{paling sedikit ada satu } \beta_{pq} \neq 0.$$

Besaran *Wilk's Lambda* yang diperoleh adalah

$$\Lambda = 0,706.$$

Statistik uji V-Bartlett yang diperoleh sebagai berikut.

$$V_{hitung} = 157,411.$$

Karena V_{hitung} lebih besar dari $\chi^2_{0,05;12}$ sebesar 21,026, maka H_0 ditolak yang berarti secara serentak, paling tidak ada satu variabel prediktor yang signifikan berpengaruh terhadap variabel respon.

(2) Pengujian Signifikansi Model Secara Parsial.

Pada pengujian ini, masing-masing variabel prediktor diuji terhadap variabel respon secara parsial. Hasil pengujian signifikansi model secara parsial ditampilkan pada Tabel 4.

Untuk variabel prediktor X_1, X_3, X_5, X_6, X_8 diperoleh $V_{hitung} > \chi^2_{0,05;2}$, maka secara parsial variabel prediktor X_1, X_3, X_5, X_6, X_8 berpengaruh signifikan terhadap variabel respon. Untuk variabel prediktor X_7 diperoleh $V_{hitung} < \chi^2_{0,05;2}$, maka secara parsial variabel prediktor X_7 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel respon, sehingga perlu dibentuk model baru dengan menggunakan variabel prediktor yang signifikan.

Tabel 4. Uji Parsial Enam Variabel Prediktor (Nilai Kritis $\chi^2_{0,05;2} = 5,99$)

Prediktor	Λ_{hitung}	V_{hitung}
X_1	0,9635	16,92
X_3	0,8948	50,57
X_5	0,9376	29,30
X_6	0,9175	39,17
X_7	0,9899	4,64
X_8	0,9541	21,39

4.4. Pembentukan Model Regresi Multivariat Tahap II

4.4.1. Modifikasi Model

Dengan menggunakan variabel prediktor yang signifikan pada Tabel 4 diperoleh model baru yaitu model dengan lima variabel prediktor sebagai berikut.

$$Y_1 = 28,169 - 0,090X_1 - 0,066X_3 + 0,126X_5 + 0,288X_6 - 0,078X_8,$$

$$Y_2 = 37,456 - 0,058X_1 - 0,075X_3 + 0,027X_5 + 0,337X_6 - 0,048X_8.$$

Jika diperhatikan kembali Tabel 3, dapat diketahui bahwa model ini adalah model terbaik dengan lima variabel prediktor.

4.4.2. Pengujian Signifikansi Model

(1) Pengujian Signifikansi Model Secara Serentak.

Dalam pengujian signifikansi model secara serentak digunakan hipotesis sebagai berikut.

$$H_0 : \beta_{pq} = 0; \quad p = 1, 3, 5, 6, 8; \quad q = 1, 2.$$

$$H_1 : \text{paling sedikit ada satu } \beta_{pq} \neq 0.$$

Besaran *Wilk's Lambda* yang diperoleh adalah

$$\Lambda = 0,710.$$

Statistik uji V-Bartlett yang diperoleh sebagai berikut.

$$V_{hitung} = 155,203.$$

Karena V_{hitung} lebih besar dari $\chi^2_{0,05;10}$ sebesar 18,307, maka H_0 ditolak yang berarti secara serentak, paling tidak ada satu variabel prediktor yang signifikan berpengaruh terhadap variabel respon.

(2) Pengujian Signifikansi Model Secara Parsial.

Pada pengujian ini, masing-masing variabel prediktor diuji terhadap variabel respon secara parsial. Hasil pengujian signifikansi model secara parsial ditampilkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Uji Parsial Lima Variabel Prediktor (Nilai Kritis $\chi^2_{0,05;2} = 5,99$)

Prediktor	Λ_{hitung}	V_{hitung}
X_1	0,9635	16,92
X_3	0,8948	50,57
X_5	0,9376	29,30
X_6	0,9175	39,17
X_8	0,9541	21,39

Karena $V_{hitung} > \chi^2_{0,05;2}$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel prediktor X_1, X_3, X_5, X_6, X_8 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel respon.

4.5. Pengujian Asumsi

4.5.1. Pengujian Asumsi Matriks Ragam Peragam Galat

Untuk memeriksa asumsi tentang kesamaan matriks ragam peragam galat, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

$$\begin{aligned} H_0 : \Sigma_1 &= \Sigma_2, \\ H_1 : \Sigma_1 &\neq \Sigma_2. \end{aligned}$$

Statistik uji:

$$\chi^2_{hitung} = (1 - c)M = 3,2752.$$

Karena χ^2_{hitung} lebih kecil dari $\chi^2_{0,05;3}$ sebesar 7,81 dapat disimpulkan terima H_0 . Ini berarti matriks ragam peragam dari dua kelompok adalah homogen.

4.5.2. Pengujian Asumsi Kenormalan Galat

Pengujian normal multivariat dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut :

$$\begin{aligned} H_0 : & \text{galat terdistribusi normal multivariat,} \\ H_1 : & \text{galat tidak terdistribusi normal multivariat.} \end{aligned}$$

Statistik uji :

$$d_i^2 = (\mathbf{e}_i - \bar{\mathbf{e}})^T \mathbf{S}^{-1} (\mathbf{e}_i - \bar{\mathbf{e}}), i = 1, 2, \dots, n.$$

Nilai *khi-kuadrat* tabel :

$$\chi^2_{tabel} = \chi^2_{\frac{1}{2},2} = 1,386.$$

Dari 458 pengamatan diperoleh 240 pengamatan atau 52,40% dengan kondisi $d_i^2 \leq 1,386$, maka disimpulkan H_0 diterima sehingga galat dikatakan terdistribusi normal multivariat.

4.6. Analisis Faktor

Berdasarkan hasil pembentukan model regresi, pengujian signifikansi parameter dan pengujian asumsi diperoleh lima program gizi yang berpengaruh signifikan terhadap persentase *underweight* (Y_1) dan *stunting* (Y_2) pada balita di Indonesia, yaitu persentase bayi mendapat ASI eksklusif (X_1), persentase balita kurus mendapat makanan tambahan (X_3), persentase ibu hamil risiko KEK (X_5), persentase wanita usia subur risiko KEK (X_6), dan persentase rumah tangga mengonsumsi garam beriodium (X_8) dengan model sebagai berikut:

$$Y_1 = 28,169 - 0,090X_1 - 0,066X_3 + 0,126X_5 + 0,288X_6 - 0,078X_8,$$

$$Y_2 = 37,456 - 0,058X_1 - 0,075X_3 + 0,027X_5 + 0,337X_6 - 0,048X_8.$$

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan, diperoleh lima program gizi yang berpengaruh signifikan terhadap persentase *underweight* dan *stunting* pada balita di Indonesia, yaitu persentase bayi mendapat ASI eksklusif, persentase balita kurus mendapat makanan tambahan, persentase ibu hamil risiko KEK, persentase wanita usia subur risiko KEK, dan persentase rumah tangga mengonsumsi garam beriodium.

Daftar Pustaka

- [1] Gaspers, V. 1992. *Teknik Analisis dalam Penelitian Percobaan*. Tarsito, Bandung
- [2] Ghozali, I. 2006. *Analisis Multivariat dengan Program SPSS, Edisi Ke-4*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- [3] Hafidi, B. and A. Mkhadri. 2006. A Corrected Akaike Criterion Based on Kullback's Symmetric Divergence : Application in Time Series, Multiple and Multivariate Regression. *Computational Statistics and Data Analysis*. **50** : 1524–1550
- [4] Johnson, R.A and D.W. Wichern. 2007. *Applied Multivariate Statistical Analysis, Sixth Edition*. Practice Hall, Jersey
- [5] Rencher, A.C.. 2002. *Methods of Multivariate Analysis*. John Wiley and Sons, New York